

OPERACJA OGÓLNOPOLSKA

WYJAZD STUDYJNY – OD BACÓWKI DO FABRYKI, DOBRE PRAKTYKI

Województwo podkarpackie, 29.08 – 02.09.2017 r.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”,
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Projekt opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Historia Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.



Hodowla owcy rasy świniarka

Stanisława Kuczera
Daniel Panek



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”,
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Projekt opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Historia zakładu doświadczalnego w Chorzelowie sięga 1951 roku, kiedy to został on przejęty przez Instytut Zootechniki w Krakowie od Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.

Do grudnia 2000 r. Zakład stanowił integralną część Instytutu Zootechniki w Krakowie jako zaplecze badawcze i rozwojowe.

Obecnie funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której głównym zadaniem jest prowadzenie hodowli zarodowej zwierząt, produkcji roślinnej a także wykonywanie prac badawczo – rozwojowych na rzecz Instytutu.

Obecnie w skład Zakładu
Doświadczalnego wchodzi 600 ha,
w tym ok. 500 ha gruntów ornych.

Wykorzystanie gruntów rolnych jak
i trwałych użytków zielonych
skierowane jest w głównej mierze na
zaspokojenie potrzeb paszowych
hodowanych zwierząt.


Zakład składa się z kilku działów:
- Ferma Krów Mlecznych




- Ferma Zwierząt Futerkowych



- Stacja Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej



- Fermy kur



- Stadnina Koni



- Hodowli owiec



Od roku 2010 w Zakładzie
utrzymywane jest stado
zachowawcze owiec rodzimej rasy
świniarka.





Świniarka jest rodzimą, prymitywną rasą owiec. Pierwotnie występowała na terenie Europy Środkowej. Wypierana poprzez krzyżowanie z bardziej kulturalnymi rasami i odmianami, najdłużej zachowała się we wschodniej części Europy Środkowej.

Licznie występowała na terenie niemal całej Polski, będąc podłożem do kształtowania późniejszych szlachetnych typów owiec krzyżówkowych.

Owce te tworzą bardzo zróżnicowaną populację. Dotyczy to zarówno pokroju jak i okrywy. Są to zwierzęta małe, drobne o prymitywnym wyglądzie.

w wieku 70 dni:

- tryczki ważą 9–12 kg, - maciorki 8–10 kg;

w wieku 12 miesięcy:

- tryczki 25–30 kg, - maciorki 22–25 kg;

zwierzęta dorosłe: tryki 40–50 kg, maciorki 25–35 kg.


Okrywa przeważnie jest biała, jednolita.

W naturalnym chowie najdłużej utrzymała się we wschodniej części Polski.

W 1987 roku została uznana za całkowicie zaginioną rasę.

Odnaleziono i zakupiono 17 sztuk maciorek i 3 tryki w celu podjęcia próby rekonstrukcji i restytucji stada; zgodnie z „Programem hodowlanym ochrony zasobów genetycznych owiec rasy świniarka”.

**Rasę tę cechuje specyficzne
zestawienie genów warunkujących
dużą zmienność i elastyczność
dziedziczenia cech w obrębie rasy,
uważanej za niejednolitą genetycznie.**



Świniarki są niezwykle odporne na choroby, szczególnie kulawkę i trudne warunki bytowania (tereny podmokłe), niewybredne w żywieniu.

Duże zdolności adaptacyjne do lokalnych warunków środowiskowych stwarzają możliwość wykorzystania tej rasy w sposób alternatywny, jakim jest ochrona i pielęgnacja krajobrazu poprzez wypas. Spełnia on wiele funkcji ekologicznych, będąc jednocześnie najbardziej ekonomiczną formą pielęgnacji środowiska.


Użytkowość świniarek jest niska. Wełna może być wykorzystana do przetwórstwa – na dywany i filce.

Naturalna skłonność do spilśniania zespołów włosowych, szczególnie w okolicy boków i podbrzusza, wskazuje na potrzebę dwukrotnej strzyży w ciągu roku.

Roczna wydajność wełny potnej wynosi od 2 (maciorki) do 3 kg (tryki). Skóry nie mają zbyt dużej wartości futrzarskiej. Produkcja mleka wystarcza tylko na wykarmienie potomstwa.

Hodowla owcy świniarki w ZDIZ Chorzów

W roku 2010 zakupiono 50 matek wraz z jagniętami oraz 34 przystępki, do „Programu rolnośrodowiskowego” trafiło na 48 sztuk, a od 2013 liczba ta wzrosła do 85 sztuk.

A photograph of a large indoor sheep pen. The pen is filled with many white sheep of various breeds, including some with thick wool and others that are leaner. The sheep are standing on a dirt floor, and some are looking towards the camera. The pen is enclosed by wooden fences and has a high ceiling with a corrugated metal roof and red structural beams. The lighting is bright, and the overall atmosphere is that of a well-maintained farm.


Na dzień dzisiejszy stado składa się z 103 matek, 39 młodych owiec, 95 jagniąt i 9 tryków.

Owce są odrobaczane 2 razy do roku. Pierwszy raz przed okresem pastwiskowym, drugi raz przed stanówką, która przypada na wrzesień.

Dwa tygodnie przed planowanym kryciem wywoływany jest u macioremek tzw. „szok białkowy” czyli podanie zwiększonej ilości pasz treściwych wysokobiałkowych, co wpływa na wywołanie rui u ok. 50 – 60% macioremek w tym samym czasie.

Żywienie maciorek kotnych jest zróżnicowane ze względu na wiek, masę ciała i okres ciąży.

W pierwszych miesiącach ciąży żywione są jak matki jałowe, dopiero pod koniec 4 miesiąca zwiększamy ilość paszy treściwej o ok. 30 dag na sztukę. W miarę wzrostu płodów pasze objętościowe wzbogacane są dodatkiem pasz treściwych.

A photograph of a sheep pen. In the background, several adult sheep are visible. In the foreground, numerous small white lambs are scattered across a floor covered in straw. The walls of the enclosure are made of vertical wooden planks. The text is overlaid on the left side of the image.

Wykoty przypadają na luty/marzec, większość z nich to wykoty pojedyncze, jednak zdarzają się bliźnięta a nawet trojaczki. Średnia waga jagniąt wynosi ok. 2kg.

Płodność stada ok. 99%

Plenność – 140%

Odchów 90%



Dziękujemy za uwagę

